Migränetherapie – aus Sicht der Allgemeinmedizin bzw. Neurologie

PD Dr. Franz Riederer

Disclosures

- Novartis
- Teva-Ratiopharm
- Eli Lilly
- Burgerstein Foundation
- Menarini
- Grünenthal

Was machen Sie?

Status Migränosus?

- 42- jährige Patientin mit Migräne ohne Aura
- Prophylaxe-Therapie mit Topiramate
- St.n. Cavernom li temporal, seit OP strukturelle Epilepsie, Therapie mit Zebinix (Eslicarbamazepin)
- Über 11 Tage eine rechts occipitalen starken Kopfschmerz, „wie ihre übliche Migräne“
- Qualität war drückend, es bestanden Licht- und Lärmempfindlichkeit
- Triptane waren nicht wirksam
- **Was machen Sie?**

Status Migränosus?

- Therapie: Bds. GON-Infiltration mit Diphrophos und Lidocain.
- Der Dauerkopfschmerz verbesserte sich, jedoch kam es nun zu einschießenden Schmerzen links occipital sowie zu einer Hypästhesie eben dort.
- Gestern wurde sie nun erneut infiltriert. Seitdem verspürt die Pat. eine minimale Zugneigung nach re. (als ob sie ein Wind streifen würde), die einschliessenden Schmerzen sistierten.
- Was machen Sie jetzt?

SWI-sequence:
Hematoma
(methaemoglobin)

MR-angiography
Occlusion of the right
vertebral artery in the
intracranial part (V4)

T1_se_tra_fs
„Fat saturated“

Missing diastolic flow in the right vertebral
artery (V2)

Wichtige „red flags“ bei Kopfschmerzen

- Neuer Kopfschmerz, wesentliche Veränderung der Charakteristik
- Alter > 50 Jahre oder < 6 Jahre
- Plötzlicher Kopfschmerz, so stark wie noch nie
- Auslösung durch körperliche Aktivität oder Valsalva-Manöver
- Dauerkopfschmerz
- Im Liegen stärker
- Fokal neurologische Zeichen (auch diskrete wie Horner Syndrom) Anfälle, Bewusstseinsstörung
- Stauungspapille
- Übelkeit, Erbrechen
- Abgeschlagenheit, Fieber, Meningismus
- Malignom, HIV oder andere aktive Infektionen in der Anamnese
- Schlaganfall oder intrakranielle Blutung in der Anamnese

Red Flags - Evidenz

- Alter > 50 Jahre
- Schlimmster Kopfschmerz, Donnerschlagkopfschmerz
- Krampfanfall, Kollaps, Bewusstseinsverlust
- Bewusstseinsstörung / Veränderung
- Übelkeit, Erbrechen
- Paralyse
- Stauungspapille

Lynch et al Cephalalgia 2012

Sobri et al Br J Radiol 2003

Einzelhandelskauffrau, 59 Jahre

- Migräne seit dem 20 Lj., zunächst alle 3 Monate
- Seit 2-3 Jahren deutliche Verschlechterung:
- Frequenz (März 2019): Aktuell bis zu 5 T pro Woche, teils 3 Tage durchgehend
- Beschreibung der Kopfschmerzen: rechts temporal, Qualität meist dumpf-drückend, selten pochend. „Pulsieren der rechten Temporalarterie“
- Begleitsymptome: Licht+Lärmempfindlichkeit, Übelkeit, teils Erbrechen, Schwarzsehen mit Sternchen während der Attacken, Lesen sei dann nicht möglich
- Einflussfaktoren: Zunahme bei körperlicher Aktivität
- Eine CCT war vor einigen Jahren normal.

Einzelhandelskauffrau, 59 Jahre

Ihre Diagnosen?

- Chronische Migräne ohne Aura und mit Aura
- Kopfschmerz bei Triptanübergebrauch
- Seltener Benzodiazepingebrauch
- Nikotinabusus
- Einschlafstörung

Was ist Migräne?

„Migraine is a brain disease“

Peter J Goadsby, 2008

Aura

≥ 5 Attacken, Dauer 4-72 Stunden

≥ 2 folgender Merkmale:

- Einseitig
- Pulsierend
- mittelmässige/starke Intensität
- Verstärkung durch körperliche Tätigkeit

≥ 1 von:

- Übelkeit und/oder Erbrechen
- Photo- und Phonophobie

Was ist eine chronische Migräne?

- A. Headache (tension-type-like and/or migraine-like) on ≥ 15 days per month for > 3 months² and fulfilling criteria B and C
- B. Occurring in a patient who has had at least five attacks fulfilling criteria B-D for 1.1 *Migraine without aura* and/or criteria B and C for 1.2 *Migraine with aura*
- C. On ≥ 8 days per month for > 3 months, fulfilling any of the following³:
 1. criteria C and D for 1.1 *Migraine without aura*
 2. criteria B and C for 1.2 *Migraine with aura*
 3. believed by the patient to be migraine at onset and relieved by a triptan or ergot derivative

Key Points

- Patient mit Migräne nach IHS-Kriterien
- Chronischen Kopfschmerzen (≥ 15 Tage/Monat)
- An 8 Tagen/Monat Migräne
- Medikamentenübergebrauch kein Ausschlussgrund

Was ist ein Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch?

Appendix 8.2 Medication overuse headache = ICHD-3

Diagnostic criteria:

- A. Headache present on ≥ 15 days/month
- B. Regular overuse for >3 months of one or more acute/symptomatic treatment drugs as defined under sub forms of 8.2.
 - 1. Ergotamine, triptans, opioids, or combination analgesic medications on ≥ 10 days/month on a regular basis for >3 months
 - 2. Simple analgesics or any combination of ergotamine, triptans, analgesics opioids on ≥ 15 days/month on a regular basis for >3 months without overuse of any single class alone
- C. Headache has developed or markedly worsened during medication overuse

Einzelhandelskauffrau, 59 Jahre

Attackentherapie

- Medikation: Eletriptan 40mg und Zolmitriptan 2.5mg (an 20 Tagen pro Monat)

Weitere Medikation

- Triazolam bei Bedarf (Schlafstörung)
- Nikotinabusus
- Depressive Störung, leicht

Frühere Therapien:

- Ein Triptan-Entzugsversuch wurde im Sommer 2018 gemacht, nach 3 Wochen keine anhaltende Verbesserung
- Topiramate habe gut geholfen allerdings sei die Fingerbeweglichkeit schlechter geworden.
- Flunarizin ohne wesentliche Wirkung

Komorbiditäten und Begleiterkrankungen bei Migräne

*Scher et al Neurology 2017
Mohmoud et al BMJ Open 2018
Radat, Cephalalgia 2005
Bendtesen et al, Cephalalgia 2014*

Einzelhandelskauffrau, 59 Jahre

- Ihre Einschätzung?
- Therapie: **ambulanter Triptan-Entzug + Prophylaxe:**
- Eindosieren von Metoprolol bis 95mg/d
- Naproxen/Esomeprazol 500/20 1. Woche 1-0-1, 2. Woche 1-0-0, dann absetzen
- Quetiapin 25mg 0-0-1, zusätzlich bei Bedarf
- Ausdauersport, nicht medikamentöse Maßnahmen

Einzelhandelskauffrau, 59 Jahre

Verlauf

- Seloken wurde noch nicht versucht aus Angst vor NW. Pat. hat kein Triptan mehr genommen. Im April 9 Kopfschmerztage. An 6 Tagen Metamizol, oder Paracetamol genommen oder analgetische Infusionen vom Hausarzt erhalten
- Ein MRT des Schädels zeigte punktförmige Signalalterationen im subkortikalen frontalen Marklager bds.
- Juni: 11 Kopfschmerztage pro Monat

Einzelhandelskauffrau, 59 Jahre

- Beginn mit Galcanezumab 240 mg s.c. (erste Gabe) im Juni 2019
- Danach nur 4 Kopfschmerztage pro Monat , an diesen Tagen Akutmedikation
- Monatlich Emgality 120mg s.c.
- In den folgenden Monaten nur 1-3 Kopfschmerztage pro Monat, keine Triptane stattdessen Naproxen/Esomeprazol
- **Lebensqualität viel besser**
- Jänner – Februar 2020 wieder 8-10 Kopfschmerztage pro Monat, Depressivität bei Belastungsreaktion, vermehrte Schlafstörung.
- Von Dezember bis Jänner war eine Therapie mit Isotretinoin erfolgt. Pat nimmt wieder Eletriptan mehrmals pro Monat
- Beginn mit Amitryptilin 10mg abends, Galcanezumab 120mg s.c. monatlich weiter.

Einzelhandelskauffrau, 59 Jahre

- Im April 4-5 mal Kopfschmerzen, im Mai nur 1 Kopfschmerztag, wobei die Patientin über 2 Wochen hindurch zusätzlich 25mg Topiramamat genommen hat. (Vor Therapie 20 Tage pro Monat)
- Auch die psychische Belastungssituation wurde gemeistert, ohne Kopfschmerz.
- NW werden keine berichtet. In Zusammenschau mit der Anamnese mit sehr großer Beeinträchtigung durch chronische Migräne ist die Weiterverordnung über ein Jahr hinaus gerechtfertigt.

Studentin (Lehramt), 27 Jahre

- 27-Jährige Frau, seit dem 11. Lj. rezidivierende Kopfschmerzen + Schwindel
- Vorstellung wegen Migräneattacken an 12-15 Tagen pro Monat meist mit Einnahme von Zolmitriptan (auch Metamizol, Dexibuprofen) unter 300mg Topiramate. Zusätzlich mehrmals pro Monat Schwindelepisoden (eher Drehschwindel)
- Laufende Medikation: Topiramate 150mg 1-0-0-1, Sertralin 100mg 1-0-0-0, L-Thyroxin 75ug 1-0-0-0
- Beschreibung der Kopfschmerzen: sehr stark, pulsierend, einseitig, Licht- und Lärmempfindlichkeit, keine Übelkeit, Dauer bis zu 2 Tagen
- Frequenz (November 2019): 11 Kopfschmerztage

Studentin (Lehramt)

Diagnosen

- Chronische Migräne
- Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch
- Vestibuläre Migräne
- Depressive Störung
- Angststörung mit Panikattacken, Sozialphobie

Studentin (Lehramt)

- Ihre Vorschläge?
- Magnesium: nicht vertragen
- Botulinumtoxin
 - Nicht Wirksam
- Februar 2020: Stationäre Aufnahme zum Medikamentenentzug
 - 100mg Aprednisolon für 5 Tage, Quetiapin bei Bedarf
 - Keine anhaltende Besserung
- Psychiatrische Vorstellung (Evaluation hinsichtlich Psychosomatik)
- Akupunkturserie

Wann ist eine Migräneprophylaxe indiziert?

DGN Deutsche Gesellschaft
für Neurologie

Indikation

- >3 Migräneattacken pro Monat
- Sehr lange Attacken (regelmäßig >72h)
- Schlechtes Ansprechen der Attacken auf die Akuttherapie
- Intolerable NW der Akuttherapie
- Zunehmende Attackenfrequenz, Schmerzmedikation an > 10 Tagen/Monat

Dauer

- 6-12 Monate, dann Überprüfung der Notwendigkeit
- Therapiewechsel: falls 2 Monate nach Erreichen der Zieldosis keine Besserung

Welche Möglichkeiten zur Migräneprophylaxe gibt es?

Antikonvulsiv wirkende Medikamente

Topiramat 25-200 mg, wirksam auch bei chronischer Migräne

Cave: kognitive Nebenwirkungen, Nierensteine, Anhidrose & Hyperthermie, Gewichtsabnahme

Valproat (nach Leber-Screening) 500-1500 mg

Cave: Schwangerschaft ausschliessen und verhüten

Evtl. vermehrte Blutungsneigung

Gewichtszunahme, Haarausfall

Lamotrigin (speziell bei Migräne mit Aura) 25-300 mg

Cave: langsame Eindosierung notwendig

Natürliche Substanzen

Magnesium 25 mmol

Riboflavin (Vitamin B2) 400 mg

Coenzym Q10 3x100 mg

Welche Möglichkeiten zur Migräneprophylaxe gibt es?

Antihypertensiva

Metoprolol 100-200 mg

Propranolol 80-160 mg

Candesartan 16 mg

(Lisinopril 20 mg)

Ca-Antagonisten

Flunarizin 5-10 mg

Antidepressiva

Amitriptylin 10-150 mg

Trimipramin 10-150 mg

NW: Müdigkeit, anticholinerge Wirkung, AV-Blockierungen; Gewichtszunahme

Venlafaxin 75-225 mg

Duloxetin 60 mg

NW: Evtl. Blutdrucksteigernd

Mirtazapin 30-45 mg

OnabotulinumtoxinA

Welche Biologicals gibt es zur Migräneprophylaxe?

Substanz (Handelsname)	Intervall	1. Dosis	2. Dosis	3. Dosis	HWZ
Erenumab (Aimovig [®])	28 Tage	70mg (140mg)	70mg (140mg)	70mg (140mg)	28 Tage
Fremanezumab (Ajovy [®])	Monatlich oder Alle 3 Monate	225mg (625mg)	225mg (-)	225mg (-)	31 Tage
Galcanezumab (Emgality [®])	Monatlich	240mg	120mg	120mg	27 Tage

Expertenstatements zu Erenzumab, Fremanezumab, Galcanezumab
 Fachinformationen zu Erenumab, Fremanzumab; Galcanezumab

Safety and efficacy of galcanezumab in patients for whom previous migraine preventive medication from two to four categories had failed (CONQUER): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b trial

Wim M Mulleners, Byung-Kun Kim, Miguel J A Láinez, Michel Lanteri-Minet, Patricia Pozo-Rosich, Shufang Wang, Antje Tockhorn-Heidenreich, Sheena K Aurora, Russell M Nichols, Laura Yunes-Medina, Holland C Detke

Mulleners et al, Lancet Neurol 2020; 19: 814–25

	Placebo (n=230)	Galcanezumab 120 mg (n=232)
Deaths	0	0
Patients with ≥1 serious adverse event	2 (1%)	2 (1%)
Patients with adverse event leading to discontinuation	0	1 (<1%)
Patients with ≥1 treatment-emergent adverse event	122 (53%)	119 (51%)
Patients with ≥1 treatment-emergent adverse event related to treatment	34 (15%)	37 (16%)
Anticipated treatment-emergent adverse events*		
Any injection site related adverse event	23 (10%)	16 (7%)
Erythema	6 (3%)	8 (3%)
Pain	13 (6%)	5 (2%)
Pruritus	0	3 (1%)
Oedema	0	2 (1%)
Discolouration	1 (<1%)	1 (<1%)
Hypersensitivity	0	1 (<1%)
Induration	4 (2%)	1 (<1%)
Paraesthesia	3 (1%)	1 (<1%)
Swelling	0	1 (<1%)
Bruising	4 (2%)	0
Haematoma	1 (<1%)	0
Reaction	6 (3%)	0
Constipation	5 (2%)	5 (2%)
Vertigo	4 (2%)	1 (<1%)
Pruritus	1 (<1%)	1 (<1%)
Urticaria	1 (<1%)	0

All other treatment-emergent adverse events ≥1.5% in any group

Nasopharyngitis	21 (9%)	16 (7%)
Influenza	7 (3%)	11 (5%)
Upper respiratory tract infection	5 (2%)	5 (2%)
Back pain	6 (3%)	4 (2%)
Bronchitis	2 (1%)	4 (2%)
Fatigue	1 (<1%)	4 (2%)
Gastroenteritis	3 (1%)	4 (2%)
Nausea	5 (2%)	4 (2%)
Oropharyngeal pain	2 (1%)	4 (2%)
Sinusitis	5 (2%)	4 (2%)
Urinary tract infection	4 (2%)	2 (1%)
Migraine	5 (2%)	1 (<1%)
Insomnia	5 (2%)	0

Data are n (%). * Anticipated treatment-emergent adverse events are those adverse drug reactions previously identified in phase 3 migraine prevention studies.¹⁸⁻²⁰ Anaphylaxis, angio-oedema, and rash have been identified as adverse drug reactions in post-marketing use (see appendix p 12).

Table 3: Summary of adverse events in the total population

Verschreibung von Emgality

Prophylaxe bei Erwachsenen mit **4 Migränetagen** pro Monat

Die Erstattung von Emgality® aus dem Grünen Bereich ist an die Einhaltung folgender IND-Regel gebunden:

Als Migräneprophylaxeversuch bei Erwachsenen, wenn zuvor **zumindest 3 medikamentöse Migräneprophylaxeversuche** von ausreichender Dauer zu

- **keinem klinisch relevanten Ansprechen** geführt haben oder
- **wegen therapiebegrenzender Nebenwirkungen abgebrochen wurden** oder
- **wegen Kontraindikationen nicht verwendet werden können.**

Indikationsstellung, Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen des Ansprechens und der Indikationsstellung durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie.

Studentin (Lehramt)

Therapeutische Überlegungen

- Betablocker, Flunarizin nicht ausreichend, Valproinsäure eher ungeeignet und wahrscheinlich früher schon versucht , von Candesartan wäre eher wenig zu erwarten.

Studentin (Lehramt)

Im März 2020 ca. 9 Migränetage; 3
Episoden mit Schwindel

Augenärztliche Ko ohne Hinweis auf
Staungspapille.

Beginn mit Galcanezumab 240mg s.c., nach
einem Monat 120mg s.c.

Topiramat Tagesdosis 250mg weiter

Verlauf unter Galcanezumab

Im Verlauf ca. 1-5 Migränetage / Monat,
weiterhin bis 3 Episoden mit Schwindel
Kopfschmerzen sind deutlich gebessert

Physiotherapeutin, 46 Jahre

- Zuweisung vom Hausarzt wegen Kopfschmerzen im Nov. 2019
- Migräne seit 20 Jahren
- Beschreibung der Kopfschmerzen:
 - pulsierend, pochend, rechts betont, Seitenwechsel möglich
 - Zunahme bei körperlicher Bewegung
 - Begleitsymptome: Photo und Phonophobie, Nausea, Ruhebedürfnis
- Frequenz: 15-20 Kopfschmerztage / Monat
- Aktuelle Therapie: 5-7 x Sumatriptan / Monat
- Aktuelle Prophylaxe: Venlafaxin 37.5mg, NW: Unruhe, Obstipation
- Frühere Therapien: Metoprolol, Mutterkraut nicht wirksam
- Ergänzende Therapien: Entspannung, Akupunktur
- Frühere Krankheiten: Hypercholesterinämie

Ihre Einschätzung?

Diagnose?

Chronische Migräne ohne Aura

Untersuchungen?

MRT Schädel: unauffällig

Therapeutische Überlegungen:

- Venlafaxin steigern (Pat. möchte es eher nicht, jetzt schon innere Unruhe unter der Dosierung bemerkt)
- Topiramate (Gewichtsabnahme, Konzentrationsstörung, cave Nierensteine, Depressivität)
- Botulinum Toxin
- Akupunktur
- CGRP-Mab?

Physiotherapeutin, 46 Jahre

- Botulinumtoxin am 5.12. 2019
- Weiterhin 15-20 Kopfschmerztage / Monat
- An 4-5 Tagen / Monat Sumatriptan oder Relpax
- EKG und Labor seien kürzlich vor Knie-OP unauffällig gewesen.
- Kein Kinderwunsch

Was machen Sie?

- Topiramamat?
- Nochmals Botox?

Verlauf unter Galcanezumab

- 240 mg Galcanezumab am 17.3., nach 1 Monat 120mg
- 6 Kopfschmerztage pro Monat, keine Triptane

Take Home Messages

- Galcanezumab bewährt sich in der klinischen Praxis
- Gute Wirksamkeit
- Gute Verträglichkeit
- Einfache Anwendung
- Bei episodischer und chronischer Migräne wirksam
- Auch bei mehreren früheren erfolglosen Versuchen einer Prophylaxe
- Auch bei Medikamentenübergebrauch

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!